

Ce tableau résume les caractéristiques des blessures subies dans la pratique des sept sports d'équipe suivants : baseball, football, hockey sur glace, crosse, rugby, ringuette et soccer. Les données énoncées sont fondées sur les données des salles d'urgence de 2007 à 2010, telles que publiées par le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT).

<b>Sport d'équipe</b>														
<b>Caractéristiques des blessures</b>	<b>Baseball</b>		<b>Football</b>		<b>Hockey sur glace</b>		<b>Crosse</b>		<b>Rugby</b>		<b>Ringuette</b>		<b>Soccer</b>	
<b>Nombre de blessures signalées (2007-2010)</b>	1 633		6 141		9 413		493		1 651		324		11 941	
<b>Blessures par groupe d'âge</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>	<b>Groupe d'âge (ans)</b>	<b>Nbre de blessures</b>
	5-9	271 (16,6%)	5-9	388 (6,3%)	5-9	681 (7,2%)	5-9	26 (5,3%)	5-9	8 (0,5%)	5-9	29 (9,0%)	5-9	1 949 (16,3%)
	10-14	949 (58,1%)	10-14	3 672 (59,8%)	10-14	5 694 (60,5%)	10-14	291 (59,0%)	10-14	376 (22,8%)	10-14	210 (64,8%)	10-14	6 946 (58,2%)
	15-19	488 (25,3%)	15-19	2 081 (33,9%)	15-19	3 038 (32,3%)	15-19	176 (35,7%)	15-19	1 267 (76,7%)	15-19	25 (26,2%)	15-19	3 046 (25,5%)
<b>Comparaison entre les sexes</b>	Les hommes ont subi 70,7 % des blessures liées au baseball		Les hommes ont subi 91,7 % des blessures liées au football		Les hommes ont subi 89,6 % des blessures liées au hockey sur glace		Les hommes ont subi 85,0 % des blessures liées à la crosse		Les hommes ont subi 68,4 % des blessures liées au rugby		Les femmes ont subi 97,5 % des blessures liées à la ringuette		Les hommes ont subi 57,7 % des blessures liées au soccer	
<b>Nature de la blessure</b>	Parmi les blessures subies : 24,0 % étaient des fractures 23,6 % étaient liées au tissu mou 2,9 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 33,3 % étaient des fractures 20,7 % étaient liées au tissu mou 5,6 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 26,0 % étaient des fractures 22,9 % étaient liées au tissu mou 10,9 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 31,2 % étaient des fractures 22,1 % étaient liées au tissu mou 3,9 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 23,7 % étaient des fractures 19,9 % étaient liées au tissu mou 11,0 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 22,5 % étaient des fractures 18,5 % étaient liées au tissu mou 16,7 % étaient des commotions		Parmi les blessures subies : 30,1 % étaient des fractures 22,6 % étaient liées au tissu mou 3,5 % étaient des commotions	
<b>Partie du corps blessée</b>	Parmi les blessures subies : 39,4 % touchaient une autre partie du corps 15,1 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 31,8 % touchaient une autre partie du corps 10,5 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 37,7 % touchaient une autre partie du corps 19,1 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 34,7 % touchaient une autre partie du corps 8,9 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 39,4 % touchaient une autre partie du corps 19,1 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 41,7 % touchaient une autre partie du corps 30,9 % étaient une blessure à la tête précise		Parmi les blessures subies : 37,8 % touchaient une autre partie du corps 9,7 % étaient une blessure à la tête précise	
<b>Blessures à la tête</b>	Les commotions représentaient 2,9 % de toutes les blessures liées au baseball  6,6 % des commotions ont été subies par des femmes âgées de 10-14 ans, et 2,3 % ont été subies par des hommes âgés de 15-19 ans		Les commotions représentaient 5,6 % de toutes les blessures liées au football  7,3 % des commotions ont été subies par des hommes âgés de 15-19 ans, et 3,8 % ont été subies par des femmes âgées de 10-14 ans		Les commotions représentaient 10,9 % de toutes les blessures liées au hockey sur glace  11,4 % des commotions ont été subies par des hommes âgés de 10-14 ans, et 16,3 % ont été subies par des femmes âgées de 15-19 ans		Les commotions représentaient 3,9 % de toutes les blessures liées à la crosse  5,2 % des commotions ont été subies par des hommes âgés de 10-14 ans, et 5,9 % ont été subies par des femmes âgées de 15-19 ans		Les commotions représentaient 11 % de toutes les blessures liées au rugby  10,6 % des commotions ont été subies par des hommes âgés de 15-19 ans, et 14,5 % ont été subies par des femmes âgées de 10-14 ans		Les commotions représentaient 16,7 % de toutes les blessures liées à la ringuette  17,5 % des commotions ont été subies par des femmes âgées de 10-14 ans		Les commotions représentaient 3,5 % de toutes les blessures liées au rugby  3,5 % des commotions ont été subies par des hommes âgés de 15-19 ans, et 7,0 % ont été subies par des femmes âgées de 15-19 ans	